

孩子的傷痕 在告訴你什麼？

10分鐘教你辨識兒虐技巧！




身體虐待

精神虐待

疏忽

請點選上方 [受虐型態]
或直接下滑從第一頁開始閱讀

請點擊每個頁面左下角 [◀ 回總目錄] 可直接跳回到本頁



請點選上方 [身體虐待類別] 或直接下滑從第一頁開始閱讀

身體虐待

1

瘀挫傷

／ 懷疑孩童受虐 ／



4歲以下的孩子：
軀幹(Torso)、耳朵
(Ear)、
頸部(Neck)受傷



4個月以下的嬰兒：
任何部位的瘀傷

TEN-4


有以上傷痕要提高警覺，有兒虐的可能性。

身體虐待

1

瘀挫傷

一般人看到瘀傷顏色不同，會認為是不同時間受虐造成，但兒童皮膚緊密程度、顏色、位置、營養狀況不同，都會影響癒合情況，不能單以顏色判斷瘀傷發生時間。



顏色不同

發生時間不同


孩子反覆受傷？

身體虐待

1

瘀挫傷

有瘀挫傷不代表受虐，可以從照顧者或孩子對受傷情形的說法來綜合判斷。



孩子在外行為




親子兩方對傷口的說法

身體虐待

2

燒燙傷

意外的燒燙傷



意外燒燙傷，會呈現「漸進過度」，也就是會有最嚴重的區塊，以該區為中心，向外受波及的皮膚較輕微。

身體虐待

2

燒燙傷



\ 斑馬紋的燙傷 /



斑馬紋(Zebra striae)是施暴者將孩子壓入熱水中，孩子會反射性蜷曲身體，腹部縐摺處沒有被燙傷，造成皮膚呈現條狀的傷勢。


身體虐待

2


燒燙傷

\ 袖套/襪子式的燙傷 /

受虐的孩子在熱水中掙扎，嘗試站起或撐起身體，造成四肢末端形成袖套/襪子式的燙傷。



掙扎時嘗試站起/撐起身體



袖套式(Glove)




襪子式傷口(Sock)

身體虐待

2

燒燙傷


危險物品舉例




熨斗



香菸



電捲棒



界線明顯

形狀規則、同該器物形狀

若施暴者使用香菸、電器等物品施虐，傷口則會呈現規則烙印的形狀，邊緣和正常皮膚會有明顯界線。

身體虐待

3

虐待性骨折

虐待性骨折通常沒有明顯外傷，較不易觀察，但可從以下外顯行為判斷。





身體虐待

3

虐待性骨折



醫事人員透過X光片發現兒童後側肋骨、肩胛骨，胸骨、顱骨發生骨折，受虐的可能性較高。



身體虐待

3

虐待性骨折



生長板骨折

大腿螺旋骨折


嬰兒比幼兒更容易發生四肢骨折，例如四肢生長板骨折，或是大腿螺旋骨折。

身體虐待

4

受虐性腦傷

- 一般稱為「搖晃嬰兒症」，發生於1歲以下嬰兒。
- 嚴重時，頭部有血腫、前葉和枕葉硬膜下出血、視網膜前有出血等情形。



身體虐待

4

受虐性腦傷

- 照顧者受不了孩子哭鬧，劇烈連續的搖晃嬰兒，或是打巴掌、重摔嬰兒，就會造成受虐性腦傷。
- 嬰兒可能出現焦躁不安、嗜睡、嘔吐、痙攣、呼吸中止等症狀。



身體虐待

5

腹部創傷

- 一般發生於2-4歲孩子
- 虐待導致的腹部創傷，可能會造成腹痛、嘔吐、煩躁、瘀挫傷。



身體虐待

6

其他補充

外觀

- 前五項常見的身體虐待可以從外觀判斷。若無明顯外傷，要從其他方面觀察受虐情形。

情緒、行為

- 孩子情緒變得易怒、攻擊性強。
- 孩子會有強烈焦慮感、無法說出原因、行為退縮。

言語

- 有的孩子會直接表達疼痛感。
- 有的孩子會透露照顧者不當的管教方式。





請點選上方 [精神虐待類別] 或直接下滑從第一頁開始閱讀

精神虐待

1

持續性謾罵

／ 持續性謾罵導致兒童一易怒 ／




持續被謾罵的孩子，會覺得自己很糟，甚至害怕犯錯。因為大腦中負責處理情緒和壓力的部分變得非常敏感，會發出「有危險」的信號，即使其實沒危險，孩子也容易感到緊張或生氣，變得更容易情緒失控。像這樣長時間處於壓力下，孩子的情緒調節能力會變差，導致遇到小事也會發脾氣。

／ 羞辱導致兒童—低自尊 ／



當孩子被羞辱時，會覺得自己不夠好、不值得被喜歡。這種感覺會讓大腦反覆記住負面的話語，孩子會開始相信那些羞辱的話是真的，覺得自己很差，什麼都做不好。這種感覺叫做**低自尊**，覺得自己不值得被愛或尊重。如果這種情況持續，孩子可能變得害怕嘗試新事物，因為他們擔心再被批評或羞辱。

＼ 孤立導致兒童—憂鬱 ／



當孩子被孤立時，會覺得沒有人關心或陪伴，心裡變得沮喪難過，對周遭環境會感到更容易緊張或害怕，不容易調整自己的心情。這種情況可能讓孩子開始覺得自己不被需要或不重要，時間久了會變得不愛說話、沒興趣做平時喜歡的事情，甚至會感到很無助，這就是所謂的**憂鬱**。

／ 威脅導致兒童—過分順應大人／



孩子長時間生活在被威脅的環境中，為了避免被罵或受罰，他們會學著迎合大人的要求，變得不敢說出自己的想法。他們會認為「只要聽話就不會被罵」，所以努力讓大人高興，甚至忽略自己的感受和需求。久而久之，孩子會失去自信，變得只會依賴別人的指示。



／ 冷漠導致兒童—過度黏人 ／

孩子長期生活在一個冷漠的環境裡，得不到父母或照顧者的關心，他們會覺得很不安全，沒有被愛或需要。他們會想一直靠近大人，才會感到安心。這會讓他們更害怕獨處，沒辦法自己處理問題。長期下來，孩子總是需要別人陪伴才能放心。




請點選上方 [疏忽類別] 或直接下滑從第一頁開始閱讀

疏忽



1

生理方面

念珠菌感染尿布疹
(較嚴重)




接觸性皮膚炎尿布疹
(較輕微)



體重過輕

生理方面的需求被忽略，包括未能提供足夠的食物、乾淨的衣物或安全的居住環境。例如，孩子經常挨餓、穿著不合時令的衣服，或住在危險、不衛生的地方。




疏忽

2

醫療方面

醫療照護不足或疏失，包括忽視孩子的健康需求，例如未按時帶孩子就醫或服藥，特別是對患有慢性病的孩子不提供必要的治療。



沒有讓罹患慢性病的孩子
定時服藥或治療



使用偏方治療急性的傷口或疾病

疏忽

3

教育方面

影響孩童的教育疏失，包括不讓孩子接受基礎教育，或對孩子的學習缺乏關注，導致學業落後或學習機會缺失，都是需要特別留意小孩是否有受到妥善照顧的徵兆。



孩童受國民義務教育的機會被剝奪



孩童上學經常遲到、缺席、甚至企圖逃學



孩童在學校常常表現出很疲累或無法專注

疏忽

4

情感方面

疏忽虐待可從孩童與家長或照顧者的「依附關係」進行觀察

- 情感關係強烈
- 有足夠信任感

生、心理需求
有被理解跟滿足



依附關係 **安全**

對周邊不信任

對孩子缺乏關心或
互動，導致孩子感到
孤獨或被忽視。



依附關係 **不安全**

疏忽


4

情感方面

不安全的依附關係


有三種型態，應該進一步觀察孩童是否有受到虐待的可能。

迴避型



孩童看到家長時缺乏反應，代表雙方關係薄弱。

矛盾型



家長對孩童的行為有時親密有時疏離，難以預測。造成孩童不安全感，難以安撫。

混亂型



看到家長時會抗拒或恐懼。

疏忽

5

監護方面

孩童未獲適當照顧 對心理與生理，產生負面影響



照顧者因為忙於工作未妥適照顧孩子，造成孩子生活起居無人照料、健康狀況未能及時察覺，情緒需求未能被理解和滿足。



疏忽

5

監護方面

外觀

孩童時常挨餓、穿著不合時令、體重過輕、發育遲緩、衛生習慣不佳。

情緒、行為

孩童態度冷漠、喪失興趣、同儕關係惡化、不願意回家

言語

孩童可能會透漏「爸媽好幾天不在家」、「都吃便利商店」、「沒有人洗衣服」，代表照顧者放任孩子獨自生活。



疏忽

6

其他補充

／ 脆弱性因子 ／

可進一步了解孩童家裡的情形，
是否有以下「脆弱因子」，透過
通報來獲得協助。



失業 貧窮
犯罪 藥酒癮
精神疾病